



Tips & tricks ter preventie van rhinopneumonie (EHV)

STAL MANAGEMENT

Scheiden sport-, fok-
en jonge paarden.



Onderling neus-contact
vermijden.




Nieuw paard in quarantaine
(4 weken).



WEIDE MANAGEMENT

Vaste groepen op de weide.



Nieuw paard op aparte weide.




Afstand tussen weide en straat.




HYGIËNE MAATREGELEN OP STAL

Elke groep paarden eigen materiaal
(borstel, kruiwagen, emmers,...).



Paard met symptomen
in quarantaine.
Bel de dierenarts.

Elk paard eigen materiaal.




BEZOEKERS

Handen wassen bij aankomst.
Geen contact met
andere paarden.



Professionele bezoekers: materiaal ontsmetten na
behandeling zieke paarden, bedrijfskleding voorzien
(overschoenen, wegwerp overall).



VACCINATIE

Gevaccineerde paarden vertonen minder
ziektesymptomen en scheiden minder virus uit.

Vaccinatie van de hele stal verhoogt
de groepsimmunitet, bespreek dit met
andere eigenaren.



VRAAG ADVIES AAN UW DIERENARTS

Meer weten: rhinobijpaarden.nl



Zoetis BV,
Rivium Westlaan 74, 2909 LD
Capelle aan den IJssel

zoetis